

Почему кошка перестаёт опираться на задние лапы

Если у кошки внезапно отнимаются задние лапы, важно сразу оценить ситуацию. Эта картина нередко указывает на повреждение, острое нарушение кровотока, сбой в работе нервной системы или выраженный болевой синдром. Чем быстрее питомец попадёт к врачу, тем выше шанс вернуть опору на лапы и избежать тяжёлых последствий.

Слабость задних конечностей у кошки может развиваться внезапно или усиливаться день [круглосуточный выезд ветеринара](#) ото дня. Владелец не стоит самому определять причину и не применять лекарства для людей. Ниже — о возможных причинах, тревожных симптомах, безопасных действиях до осмотра и подходах к терапии.

Как это выглядит

Отказ задних лап — это не самостоятельный диагноз, а симптом целого ряда состояний. Питомец может подтягивать заднюю часть тела, падать на бок, не опираться на конечность или полностью лежать. Иногда страдает только одна лапа, иногда — обе задние лапы.

- Резкая неустойчивость при ходьбе
- Волочение конечностей или опора на подъём
- Крен тела в одну сторону
- Крик или агрессия при прикосновении
- Задержка мочи

Важно различать ситуации, когда животное не встаёт на задние лапы и дышит тяжело. Такая комбинация бывает признаком болевого шока или сосудистой катастрофы, поэтому медлить нельзя. Когда причина в сосудах или сердце, помощь нужна в течение ближайших часов.

Что может стоять за симптомом

Причины разнообразны, и точный диагноз ставит специалист. Ниже — основные группы, которые учитывают в первую очередь.

- Повреждение при падении, ударе или драке
- Сосудистая проблема, при которой нарушается кровоснабжение
- Патология спинного мозга или нервных стволов
- Выраженный болевой синдром
- Нарушения обмена веществ
- Инфекционные и воспалительные процессы

Порой слабость задних конечностей объясняют возрастом. У старых животных возможны возрастные изменения, но резкая потеря опоры не является обычной нормой старости. Также стоит помнить о породных особенностях, например о вислоухих кошках с проблемами **вызов ветеринара круглосуточно москва** задних лап.

Что делать до осмотра врача

Пока едет врач, главное — безопасность и спокойствие. Не пытайтесь вправлять конечности, массировать позвоночник или ставить уколы. Не применяйте человеческие обезболивающие: это может скрыть симптомы и навредить.

- Уложите кошку на ровную поверхность
- Оградите от других животных и детей
- Не поднимайте за передние лапы и не тяните за хвост
- Сохраняйте тепло и не кормите насильно
- Зафиксируйте, что и когда произошло

Перевозить лучше в жёсткой переноске или коробке. Если подозревается травма позвоночника, тело фиксируют ровно. Задержка мочеиспускания — дополнительный повод спешить.

Как врач ставит диагноз

Приём начинается с расспроса и осмотра. Специалист оценивает чувствительность, рефлексы, пульс, температуру и болевую реакцию. Затем назначают обследования для уточнения причины.

- Рентгенография костей и суставов
- Ультразвуковое исследование органов и сосудов
- Лабораторные анализы крови и мочи
- ЭКГ при подозрении на сердечную причину
- Неврологический осмотр для оценки спинного мозга

Объём диагностики зависит от тяжести. Часть процедур возможна на дому, часть требует клиники. Не откладывайте обследование при внезапной потере опоры.

Как лечат

Терапию подбирают по причине. При травме может понадобиться операция и иммобилизация. При сосудистой проблеме важна срочная помощь. При неврологических причинах используют препараты и восстановление.

Состояние	Что делают	Цель	Травма	Стабилизация, обезболивание, при необходимости операция	Вернуть
опору и уменьшить боль	Сосудистая проблема	Экстренная госпитализация и поддержка	кровотока	Сохранить жизненно важные функции	Неврология
восстановить движения	Болевой синдром	Обезболивание по назначению	Дать комфорт и покой	Медикаменты, физиотерапия, уход	Постепенно

Дома важно строго соблюдать назначения. Не добавляйте препараты без согласования. Если состояние ухудшается, сообщите врачу.

Когда нужно срочно вызывать врача

Есть признаки, при которых помощь нужна немедленно. Потеря опоры на задние лапы — уже серьёзный повод. Особенно если состояние развилось резко.

- Затруднённое дыхание или синюшные слизистые
- Судороги, потеря сознания
- Кровотечение, которое не останавливается

- Отсутствие мочеиспускания
- Резкая боль и крик

Когда животное не встаёт и тяжело дышит, не откладывайте помощь. Раннее обращение повышает шансы.

Уход и восстановление

Восстановление может занять время. Важны покой, мягкая подстилка и удобный доступ к воде. Если кошка не может ходить, следите за гигиеной.

- Не принуждайте вставать
- Переносите на ровной поверхности
- Следите за кожей и шерстью
- При задержке мочи сразу связывайтесь с врачом
- Выполняйте назначения и приходите на осмотр

Не наносите согревающие средства на позвоночник. Не применяйте лекарства без назначения. Прогноз зависит от причины и скорости обращения.

Профилактика

Не все причины можно предотвратить. Но некоторые риски снижают базовые меры. Регулярные осмотры помогают заметить проблему раньше.

- Сделайте окна и балконы безопасными
- Убирайте токсичные вещества и растения
- Контролируйте вес и активность
- При травме сразу обращайтесь за помощью
- Регулярно посещайте врача

Если у питомца есть хронические болезни, следуйте плану лечения. Это уменьшает риск обострений.

Заключение

Потеря опоры на задние лапы — повод срочно оценить состояние. Причины могут быть разными: от травмы до сосудистой или неврологической проблемы. Не лечите самостоятельно и не откладывайте визит к специалисту.

Ранняя диагностика и лечение повышают шансы на восстановление. Соблюдайте рекомендации врача, обеспечьте покой и уход. При ухудшении состояния сразу обращайтесь за помощью.

Часто задаваемые вопросы

Почему у кошки отнимаются задние лапы?

Возможны травма, сосудистая катастрофа, неврологическая патология, выраженная боль, обменные или инфекционные причины. Точную причину устанавливает специалист после осмотра и диагностики.

Что делать до приезда врача?

Уложите на ровную поверхность и обеспечьте покой. Не вправляйте лапы, не растирайте позвоночник, не применяйте человеческие препараты. Соберите сведения о произошедшем и дождитесь врача.

Когда обращаться немедленно?

При тяжёлом дыхании, судорогах, обмороке, кровотечении, задержке мочи или сильной боли. В этих случаях медлить нельзя.

Как ставят диагноз?

Проводят осмотр, оценивают рефлексы и чувствительность. По показаниям назначают рентген, УЗИ, анализы, ЭКГ и неврологический осмотр. Часть процедур возможна на дому, часть — в клинике.

Допустимо ли обезболивание дома?

Нет, без назначения врача нельзя. Человеческие препараты могут навредить и исказить картину. Схему обезболивания подбирает врач.

Вернётся ли подвижность?

Прогноз зависит от причины и скорости обращения. Ранняя диагностика и лечение повышают шансы. Дальнейшие рекомендации даёт лечащий врач.